

La leptospirose est une maladie infectieuse (spirochètose) transmise par les rongeurs.



La transmission à l'Homme se fait par :

- **mode direct**, c'est-à-dire les morsures.
- **mode indirect**, c'est le mode de transmission le plus fréquent. Ce type de contamination se fait par contact de muqueuses (buccale, digestive, génitale, nasale, conjonctive...) ou de lésions avec un milieu tel que les eaux douces, sols humides, eaux résiduaires, caves ou fossés souillés par les urines de rongeurs contaminés.

Les agents d'entretien du littoral, les vétérinaires et leurs assistants ainsi que les travailleurs des travaux publics sont donc les travailleurs les plus exposés.

La leptospirose se manifeste par des symptômes tels que fièvre, douleurs, urines très colorées (atteinte des reins), ictère (teinte jaune en rapport avec une atteinte du foie) et parfois méningite. Elle est reconnue comme maladie professionnelle (tableau n° 19).

Pour prévenir toute contamination, quelques précautions sont à prendre :

- soigner, panser et protéger les plaies cutanées
- **porter des vêtements imperméables, bottes et gants lors de contact avec de l'eau ou des objets potentiellement souillés (ex : cartons humides)**
- transporter déchets et cadavres de rongeurs dans un sac étanche
- se laver les mains en cas de contact direct avec un rongeur
- **faire vacciner les salariés particulièrement exposés.**



Le vaccin contre la leptospirose (Spirolept) ne protège pas contre toutes les formes de la maladie, il ne protège que contre la forme la plus grave de la maladie, et ne dispense donc pas de prendre les précautions citées ci-dessus.

Echéancier de la vaccination contre la leptospirose



28/05/2009

ASSOCIATION SANTÉ AU TRAVAIL DU PAYS BASQUE

Secteur Bayonne : Rés. Toki Lana - 7, ch. de MAROQUETTE - 64100 BAYONNE - ☎ 05 59 25 61 08 - e-mail : bayonne@astpb.com
 Secteur St Jean de Luz : 137, av. de JALDAY - 64500 ST JEAN DE LUZ - ☎ 05 59 51 98 51 - e-mail : saint-jean-de-luz@astpb.com
<http://www.astpb.com>